

مبارزه با علفهای هرز گندم و جو



با توجه به اینکه **علفهای هرز** با ممانعت از رشد مطلوب گیاهان زراعی روی عملکرد محصول آنها تأثیر می گذارند، لذا کنترل آنها در کلیه مراحل رشد گیاهان زراعی من جمله گندم و جو الزامی است.

طی بازدیدهای مکرر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از مزارع گندم و جو منطقه، مشخص گردیده در سالجاری جمعیت علف های هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع بالا می باشد. بنابراین لازم است کلیه کشاورزان منطقه

به محض انجام عملیات آبیاری طی روزهای جاری

در یک تا دو مرحله (با در نظر گرفتن نوع علف هرز غالب مزرعه)، نسبت به انجام سمپاشی مزارع اقدام، تا ضرر و زیانی متوجه محصول آنان نگردد.
نکات:

۱- در کلیه مراحل عملیات سمپاشی مزارع، با کارشناسان کلینیکهای گیاهپزشکی شهرستان مشورت گردد.

۲- کالیبراسیون (تنظیم) سمپاش قبل از سمپاشی بسیار ضروری است.

۳- بسته به نوع علف هرز غالب مزارع از علف کش های مناسب مطابق جدول ذیل استفاده شود.

نوع علف هرز غالب مزرعه	نوع سم مورد استفاده	توضیحات
باریک برگ	۱- سم تراکسوس به میزان ۱/۲ لیتر در هکتار ۲- سم پوماسوپر یا آکسیال به میزان ۱ تا ۱/۲ لیتر در هکتار	از مصرف تراکسوس در مزارع جو اکیدا خودداری شود.
پهن برگ	۱- توفوردی به میزان ۲-۱/۵ لیتر در هکتار ۲- سم گرانستار به میزان ۲۵ گرم در هکتار	در خصوص علف هرز میاگروم (گل زردی) از هر دو سم همزمان استفاده شود. (مشورت با کارشناسان الزامی است)
پهن برگ و باریک برگ	۱- سم تراکسوس به میزان ۱/۲ لیتر در هکتار به همراه ۲۵ گرم سم گرانستار در ۴۰۰ لیتر آب ۲- سموم دو منظوره آتلولو و یا آتلاتیس	جهت استفاده از سموم دو منظوره حتماً با کارشناسان کلینیکهای گیاهپزشکی شهرستان مشورت شود.